



Informations sur la vaccination contre le COVID-19

Le vaccin est-il sûr et efficace ?

En Suisse, tout vaccin doit être autorisé et s'accompagner d'une recommandation. Il doit en plus satisfaire à des critères élevés de sécurité, d'efficacité et de qualité. L'Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic a soumis le vaccin contre le COVID-19 à des études très précises avant de l'autoriser. Sûr et efficace, il a déjà été administré à plusieurs dizaines de milliers de personnes lors des essais cliniques. Le vaccin est également sûr et efficace pour les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques. Les essais le montrent : aucun effet secondaire sévère n'a été constaté à ce jour (état mi-décembre 2020). Swissmedic continue de surveiller la sécurité et l'efficacité du vaccin.

Qui ne devrait pas se faire vacciner ?

La vaccination contre le COVID-19 n'est pas recommandée aux :

- > personnes ayant une allergie sévère confirmée à un des composants du vaccin (notamment PEG).
- > femmes enceintes ; aucune donnée n'est encore disponible sur la vaccination pendant la grossesse.
- > enfants et adolescents de moins de 16 ans ; aucune donnée n'est encore disponible pour cette tranche d'âge.

Attention : Vous avez une forte fièvre ? Vous êtes malade ou ne vous sentez pas bien ? Reportez alors le rendez-vous fixé pour le vaccin. Vous attendez le résultat du test COVID-19 ? Vous vous trouvez en isolement ou en quarantaine ? Reportez le rendez-vous et rattrapez la vaccination dès que possible.

Comment se déroule la vaccination ?

Le vaccin est administré au moyen d'une piqûre dans le haut du bras.

Combien d'injections sont nécessaires ?

Deux. Vous pouvez faire la seconde environ quatre semaines après la première.

Important : Les deux injections sont nécessaires pour garantir une protection optimale.

Quelle protection offre la vaccination ?

Votre corps développe une protection contre le COVID-19. La protection est atteinte une semaine après la seconde injection. Le vaccin renforce votre système immunitaire et le prépare à combattre le virus. La vaccination réduit fortement le risque d'attraper le COVID-19.

Important : Il n'existe pas de protection totale. Certaines personnes pourront tomber malades malgré la vaccination. Cette dernière augmentera toutefois leurs chances de ne pas connaître d'évolution sévère de la maladie. Vous trouverez des informations détaillées concernant la vaccination à cette adresse : www.ofsp-coronavirus.ch/mrna

Combien de temps dure la protection vaccinale ?

On ne le sait pas encore. Pour l'instant, les fabricants étudient la durée de la protection offerte par la vaccination. Il est possible que nous recommandions une autre vaccination après un certain temps.

Y a-t-il des effets secondaires ?

Toute vaccination peut avoir des effets secondaires. Le plus souvent, ils sont légers et passent rapidement. Les effets secondaires sévères sont très rares. Par exemple, une forte réaction allergique immédiatement après l'injection.

Quels effets secondaires sont possibles ?

- > des réactions au point d'injection, telles que douleur, rougeur et gonflement
- > des maux de tête
- > de la fatigue
- > des douleurs musculaires et articulaires
- > des symptômes généraux, tels que des frissons, une sensation de fièvre ou une légère fièvre

Ces effets secondaires surviennent souvent après une vaccination. Ils montrent que le corps développe une protection. Sous une forme légère, c'est donc un bon signe. Une réaction allergique peut provoquer un gonflement, une rougeur, des démangeaisons ou des difficultés à respirer. Si ces symptômes apparaissent, contactez immédiatement votre médecin.

Continuez de suivre les règles d'hygiène et de conduite avant et après chaque vaccination.





Auto-évaluation

Puis-je me faire vacciner ?

Vous avez moins de 16 ans.		Vous avez plus de 16 ans.
Vous êtes enceinte ou pensez l'être.	Vous allaitez.	
Vous êtes allergique aux composants du vaccin (polyéthylène glycol).	Vous êtes polyallergique et vous avez déjà eu une très grave réaction par le passé.	
	Vous êtes sévèrement immunosupprimé-e.	
Vous avez de la fièvre ou d'autres symptômes compatibles avec le COVID-19.		Les symptômes compatibles avec le COVID-19 ont disparu.
Vous êtes en isolement ou en quarantaine.		Votre période d'isolement* ou de quarantaine est terminée.

*Il est recommandé aux personnes atteintes du COVID-19 (test positif et symptômes) d'attendre trois mois avant de se faire vacciner.

Vous ne pouvez actuellement pas vous faire vacciner.

Parlez-en à votre médecin.

Prenez rendez-vous pour vous faire vacciner.